

Test pitanja iz interne medicine

1. sta se vidi na rtg ileusa
 - hidroaericka polja
2. povecanje kog enzima kod acc pankreatitisa
 - amilaze
3. toksicni megakolon se vidi kod
 - ulceroznog kolitisa
4. pseudo membranozni kolitis nastaje zbog
 - preterane upotrebe antibiotika
5. kod chr bubrezne insuficijencije dolaazi do
 - izrazitog smanjenja bubrega
6. kod nefrotskog sindroma proteinurija je
 - preko 3.5g
7. stridorozno disanje se cuje kod
 - opstrukcije larinksa
8. dg potvrda tumora pluca
 - biopsijom
9. kod gihta imamo povecanje koje supstancije
 - purina u urinu
10. reumatoidni artritis zahvata
 - sinovijalni deo zgloba
11. zvonom stetoskopa se slusa
 - viskokofrekventni tonovi I mitralna stenoza
12. u th bronhijalne astme se koriste
 - glukokortikoidi
13. sta se daje u teskom obliku astme
 - adrenalin 0.5 mg subkutano
 - Aminofilin 6 mg/kg iv odmah, akasnije 3x3 mg/kg
 - Terbutalin (bricalin) 0.25 mg iv
14. status asthmaticus traje duze od
 - 12 h
15. dg pneumonije
 - rtg grudnog kosa
16. kod reumatoidnog artritisa promene su simetricne
 - na malim zglobovima sake I stopala
17. kod anafilakticke reakcije imamo povecanje
 - IgE imunoglobulina
18. kod hipohromne anemije imamo nedostatak
 - Fe
19. kod perniciozne anemije, vit B12 primenjuje se
 - doivotno
20. ako se krvarenje nastavi I posle primene oralnih antikoagulanasa, daje se
 - krioprecipitat
21. uremija je
 - hipokalijemija I hipovolemija
22. kod dijabetesne ketoacidoze dajemo
 - insulin brzog (kratkog) dejstva
23. feohromocitom se odlikuje
 - hipertenzijom, tahikardijom, hiperemijom
24. pulsus paradoxus nastaje
 - kad je pad pritiska za vreme inspirijuma za 10 mmHg
25. sta je kardijalni index
 - L/min x m² telesne površine
26. kod mitralne stenoze cujemo
 - zvek otvaranja, naglasen I ton, dijastolno dobovanje I presistolni sum
27. S1 nastaje
 - zatvaranjem AV zalistaka krajem dijastole komore
28. sta je uzrok hronicnog plucnog srca
 - bolesti koje ostecuju dis puteve (HOBP, fibroze, resekcije)
 - bolesti koje otezavaju pokrete gr kosa
 - bolesti koje ostecuju sudovnu mrežu pluca
29. bilijarne kolike se jabljaju kod
 - zucne kese
30. sta je hirzuitizam
 - pojacana maljavost
31. u pogorsanju astme se daje
 - adrenalin + beta2 stimulatori
 - O₂ (33% sa vazduhom 1-4 L/min, 5% glukoza), aminofilin 6 mg/kg odmah u 5% gly 20 min kasnije 3x3 mg/kg
 - Urbazon 4x4 mg iv prva 3 dana
 - zatim da zameniti sa 60mg pronisona
32. najcesca lokalizacija TBC
 - vrhovi pluca
33. kako zapocinje th astme
 - bronhodilatatori u aerosolu

34. sta izaziva pneumoniju u bolnickim uslovima
- streptokok
35. EKG infarkta se karakterise
- elevacijom ST segmenta
36. paroksizmalna nocna dispneja
- javlja se kod srcane insuficijencije
37. serumska bolest
- bolest imunih kompleksa
38. sta se javlja kod sistemske anafilakse –
sve navedeno
39. trijas simptoma kod graves-basedovljeve
bolesti
- hipertireoza, struma, orbitopatija
40. sta je entenzitis
- zapaljenje tetiva
41. kod RA bolovi se javljaju
- ujutru I pri imobilizaciji
42. sta je II stadijum Hodgkina
- zahvacenost 2 ili vise regiona sa iste
strane dijafragme
43. zasto nastaje prim bil ciroza
- autoimuno
44. koje vrednosti TA se smatraju normalnim
- 140/90 mmHg
45. kod koje od sl bolesti se javlja chr resp insuff
- kifoskolioze
46. koja je razlika izmedju acc cystitisa I
pijelonefritisa
- povicena temperatura
47. kod sideropenijske anemije th je
- Fe
48. u koje bolesti spada adisonova bolest
- autoimune bolesti
49. galop sritam se javlja kod
- srcane insuf
50. adrenokortikalni hormoni nastaju iz
- jezgra holesterola
51. koji lek nije za bronhijalnu astmu
- beta blokatori
52. koje su karakteristike SLE
- eritem, diskovi, fotosenzitivnost, ANA
53. kakav je pulsus parvus et tardus
- male visine I spor
54. patohistoloski nalaz kod ciroze
- fibroza, noduli, nekroza
55. kod anemija nastalih zbog drugih bolesti treba
leciti
- druge bolesti
56. anafilakticki sok nastaje za
- tideset min od unosa alergena
57. kod tumora rektuma petogodisnje prezivljavanje
zavisi od
- stadijuma
58. ulcerozni kolitis se karakterise
- sluzavo krvavim dijarejama
59. koji deo najcesce zahvata mb. Chron
- ileocekalnu regiju
60. kod fibrilacije komora puls
- se ne pipa
61. cime se karakterisu faze poboljsanja bubrezne
insuf
- poliurijom
62. adisonova bolest se karakterise
- hiponatremijom I hiperkalijemijom
63. kod aortne stenozе periferni puls je
- parvus et tardus
64. kakav tok ima artritis kod gihta
- akutni
65. kod bubrezne insuf pratimo
- conc kreatina u krvi tj klirans kreatinina
66. sta je tipicno za lupus
- postojanje ANA
67. sta je od navedenog komplikacija pneumonije
- pleuritis
68. gde se javlja poliurija polidipsija
- dijabetes melitus I dijabetes insipidus
69. reiterov sy karakterisu
- seronegativni artritis, reaktivni artritis,
HLA-B27, koza, oci, asimetrični oligoartritis
70. chr pankreatitis se karakterise
- steatorejom, kalcifikacijama pankreasa,
dijabetes melitusom
71. za nefritski sindrom je karakterissticno
- eritociturija, edemi, povecan TA
72. hepatolentikularnudegeneraciju karakterise
deficit
- ceruloplazmina

73. krajnji stadijum ankilozirajućeg spondilitisa je
- destrukcija zglobne strukture
74. s1 nastaje na spajanju
- pretkomorskog I komorskog p na kraju dijastole komora
75. plućnu emboliju karakterise
- S1T3Q3 – McGuine White znak
76. u th TBC daje se
- rifampicin, izonijazid, etambutol, pirazinamid
77. u th feohromocitoma dajemo
- alfa blokatore
78. klinefelterov sindrom je
- 47 xxy, ginekomastija, primarni hipogonadizam
79. atipicne pneumonije uzrokuju
- mikoplazma pneumoniae, legionella, chlamidia
80. tofiti u gihtu su porekla
- monoamino-urata
81. transferin je povećan kod
- hemolitičke anemije
82. subklinička tipotireoza je
- smanjenje T4 sa posledicnim povećanjem TSH
83. karakteristična lokalizacija ulceroznog kolitisa
- sigma
84. hirzuitizam je
- prisustvo terminalnih folikula dlake na nefiziološkim mestima
85. koja bolest ne priada chr sistemskim bolestima veivnog tkiva
- DM/PM
86. th NSAIL postizemo
- kontrolu upale I smanjenje bola
87. karakteristike bronhiektazije su
- chr gnojna ekspektoracija pretežno ujutru sa periodima egzacerbacije I remisije
88. pri pksigenoterapiji pritisak PO2 treba da bude
- manji od 8 kPa
89. adisonaska kriza se karakterise kojim simptomima
- hiperkalijemija, el disbalans, aritmije, dehidracija
90. ako je tireoidna zlezda bolna, tvrda, povišena SE, leukocitoza
- subakutni tireoiditis
91. patognomonican nalaz kod ciroze su
- regenerativni nodulusi
92. th idiopatske trombocitopenije
- kortikosteroidi
93. vise od sto adenoma colona je
- familijarna adenomatozna polipoza
94. centralna cijanoza se lokalizuje na
- bukalnoj sluznici I jeziku
95. najcesci uzrocnik respiratorne insuff
- HOBP
96. tipicni simptomi u hipertenzivnoj krizi kod osoba sa feohromocitomom su
- hipertenzija, glavobolja, tahikardija, bleđa/crvena koža
97. dg karcinoma zeludca se postavlja na osnovu
- gastrokopije I histoloske analize biopsije
98. toksicni megakolon najcesca je komplikacija
- ulceroznog kolitisa
99. sta nije uzrokchr plucnog srca
- mitralna stenoza
100. anurija/ oligurija kod bolesnika sa tamponadom srca se resava
- hitnom perikardnom punkcijom ili hirurskom drenazom perikarda
101. dg srcanih aritmija se najcesce zasniva na osnovu analize
- EKG analize P talasa I QRS kompleksa I njihovog medjusobnog odnosa
102. th ulceroznog kolitisa
- zavisi, slicno kao I kod Chrona od zahvacenosti creva, stadijuma...
103. antiinflamaciona th bronhijalne astme podrazumeva
- kortikosteroide
104. akutne kompikacije diabetes mellitusa su
- ketoacidoza, hiperglikemijska hiperosmolarna koma i lakticka acidoza
105. koji su simptomi hronicnog ezofagitisa
- disfagija, odinofagija
106. poremećaj funkcije proximalnog tubula daje
- glikozuriju, proteinuriju I aminoaciduriju
107. kako kateholamini dovode do hiperglikemije
- stimulisu glikogenolizu u jetri

108. terapija Ca pluća koji je nemikrocelularni je
- hirurska, radioth I hemioth
109. pacijentu, koji je imao AIM, posle 2 dana hospitalizacije javlja se holosistolni sum u III I IV MRP, dispnea I hipotenzija. Sta je uzrok?
- ruptura papilarnog misica ili septuma
110. pacijent, 56 god, primljen u bolnicu TA 80/60, puls 52, na EKGu svez infarkt miokarda. Od cega zavisi prognoza?
- od prostranosti infarkta
111. pacijentkinja 27 god javlja se sa eritemom lica, artritism, hematurijom. Koju dg proceduru zahteva?
- ANA I Le celije
112. pacijent 73 god primljen sa bolom u abdomenu. Imao infarkt miokarda pre I ima poremećaj ks donjih ekstremiteta. auskultatorno utisana peristaltika. Koja je dg?
- tromboza mezenterijalne vene
113. pleuralni izliv tipa transudata nastaje kao posledica?
- poremećaja hidrostatskog I osmotskog pritiska
114. PPR-kozni test kod nebesezirane dece ispod 3 god starosti znaci
- da je dete bolesno od primarne tuberkuloze I da ga treba lečiti
115. intrahospitalne pneumonije po definiciji su
- inf donjeg dela resp trakta nastale u bolnici koje nisu postojale prilikom prijema bolesnika na lečenje
116. sindrom izolacije hipofize nastaje kao posledica
- destruktivne lezije u predelu hipofizne peteljke (povreda, tumor, spontano)
117. medularni karcinom tiroidee potice od?
- parafolikularnih C celija, cesci je u žena, max incidenca u 5-6 deceniji, javlja se sporadicno ili u MEN sindromu
118. testovi za procenu funkcije tubula proximalnog podrazumevaju pracenje
- glikozurije, proteinurije, amminoacidurije
119. osnovna kl karakteristika hipokalijemije je
- misicna slabost
120. th acc hipokalcijemije podrazumeva primenu
- 10ml 10% Ca-glukonata IV
121. EKG u AIM je
- elevacija ST segmenta
122. limfomi su
- maligni tumori limfocita I histiocita
123. kod bolesnika sa hemofilijom kontraindikovana je primena kojih lekova
- aspirina I ostalih lekova koji smanjuju funkciju trombocita
124. srcana insuff po definiciji predstavlja
- disfunkciju leve ili desne komore
125. sinkopa se moze javitiod
- aortne stenoze
126. aortna stenoza kojim se sumom karakterise
- kresendo-dekresendo sistolni sum koji pocinje malo posle prvog tona
127. reumatoidni faktor je auto-at koje se nalazi
- u reumatoidnom artritisu I drugim sistemskim bolestima vezivnog tkiva
128. bronhopstrukcija se potvrđuje na osnovu smanjenja
- FEV1/FVC
129. bakterija koje izazivaju acc cistitis kod mladjih žena je najcesce
- E colli
130. prvi znaci poststreptokoknog glomerulonefritisa javljaju se
- 2 nedelje posle pojave gusobolje
131. hiperosmolarna neketogena koma je najcesca komplikacija
- dijabetes melitusa tipa 2
132. posle uzimanja leka anafilakticki tip preosetljivosti nastaje u roku od
- 30 min
133. u th hipertenzije kod feohromocitoma daju se
- blokatori alfa adrenergickih receptora

Test april 2006

1. kriterijumi za znacajnu luminalnu stenozu k suda

- a) 20%
- b) 45%
- c) 50%
- d) 75% +
- e) 90%

2. pacijent je dobio medikamentoznu alergiju tokom hospitalizacije. anamnesticki je utvrđeno da je koristio beta blokatore .koji lek treba koristiti da bi mu se korigovala hipoTA?

- a) terbutalin
- b) adrenalin
- c) glukagon +
- d) beta agonisti
- e) difenilhidramin

3. pacijent ima ak nefrotski sy. jedina dg je biopsija bubrega. Koja je kontraindikacija za biopsiju

- a) dijastolne TA >120mmHg +
- b) proteinurija
- c) uremija
- d) kreatinin >600

4. uremiju karakterisu: metabolički poremećaj

- a) hipovolemija
- b) hipokalemija
- c) hiperkalemija I hipervolemija +
- d) hiperglikemija

5. infekciju urinarnog trakta kod dijabetičara treba lečiti kao

- a) komplikovanu infekciju
- b) nekomplikovanu infekciju
- c) ne treba lečiti
- d) lečiti antibiotikom I malim unosom tečnosti
- e) uroantiseptikom

6. kronovu bolest treba lečiti sa

- a) 5 ASA I glukokortikoidima
- b) antibiotikom
- c) glukokortikoidima
- d) lečenje je slicno kao th ulceroznog

kolitisa, zavisi od aktivnosti bolest, rasirenosti I sl...

+

7. znaci-fiz nalaz za mitralnu stenozu

- zvek otvaranja MV, naglasen prvi ton, dijasolno dobovanje, presistolno pojaćanje

8. prvi znaci reumatoidnog artritisa su

- bol u malim zglobovima sake I stopala

9. krvarenje kod predoziranja OAKT se leci sa

- a) vit K
- b) smrznuta plazma +
- c) konc trombocitima
- d) punom krvi
- e) opranim Er

10. pseudomembranozni kolitis nastaje kao posledica upotrebe

- antibiotika

11. sribor nastaje kao posledica opstrukcije u nivou

- a) gornjih dis puteva
- b) donjih dis puteva
- c) larinksa +
- d) perifernih dis puteva

12. pri pojavi bola u dif dg anginoznog bola, ne treba sumnjati na

- a) disekantnu aneurizmu
- b) spazam jednjaka
- c) kostohondritis
- d) emfizem +
- e) perikarditis

13. hipogonadotropni hipogonadizam nastaje zbog

- a) insuf jajnika I testisa
- b) nereagovanja na receptorskom nivou
- c) insuff hipotalamusa, hipofize I visih

nervnih centara +

14. antizapaljenski lekovi u th astme su

- a) antibiotici
- b) beta 2 agonisti
- c) antiholinergici
- d) glukokortikoidi +

15. S3 ton se cuje kod

- a) infarkta miokarda
- b) srcane insuff
- c)
- d)

pitanja 5,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,25 sa oct testa 2005

September test

1. Test acidifikacije urina ne radi se kada je klirens kreatinina nizi od 20ml/min, 40ml/min, **60ml/min**, 80ml/min, 100ml/min
2. Parenteralna supstitucija albumina u nefrotskom sindromu je: obavezna, zabranjena, **sprovodi se ako postoji oligurija I porast azotnih materija**, nikad nije procena primenom diuretika, opasna zbog mogucnosti pojave alergije
3. Osobama koje su imale streptokoknu anginu urin treba kontrolisati: 2 dana od pojave gusobolje; 5 dana od pojave gusobolje; **2 nedelje od pojave gusobolje**; 6 nedelja od pojave gusobolje; 2 meseca od pojave gusobolje
4. Kod bolesnika sa hronicnom bubreznom slaboscu uz diuretike Henleove petlje: ne smeju se davati ACE inhibitori; **nije potrebno supstituisati kalijum**; obavezno treba dati supstituciju kalijuma; treba savetovati ishranu bogatu kalijumom; ne sme se davati kardiotonik zbog opasnosti od hipokalijemije
5. Najvazniji kriterijum postignute remisije u akutnoj leukemiji: normalna krvna slika; odsustvo blasta u perifernoj krvi; odsustvo organomegalije I purpura; <10% blasta u mijelogramu; <5% blasta u mijelogramu
6. Koje vrste anemija se klasifikuju u anemije zbog poremećaja u sazrevanju **Sideropenijske, megaloblastna, talasemija**
Stecene hemoliticke, membranopatske I enzimopatske urodjene hemoliticke anemije
Anemija u endokrinim bolestima I HKI
Mijelofizicna anemija I nutritivna anemija
Paroksizmalna nocna hemoglobinurija, imunoheoliticcka anemija
7. Kod bolesnika sa hemofilijom B krvarenje se zaustavlja: krioprecipitatom; dezmopresinom(DDAVP); **koncentratom faktora IX**; transuzijama trombocita
8. Za dif dg odredjenih tipova limfoma
 - Dovoljno je naciniti biopsiju uvecane limfne zlezde sa morfoloskom analizom tumorslog tkiva
 - U fizikalnom nalazu utvrditi postojanje signifikantne periferne limfadenopatije
 - Na CT abdomena proveriti postojanje splenomegalije
 - Najznacajnije je odrediti imunofenotip tumorskih celija
 - Potrebana je analiza kostne srzi
9. Sta je obavezna th u sindromu lose malapsorpcije
 - Hrana bez mleka
 - Kortikosteroidi
 - **Dijeta bez glutena**
 - Vit B kompleksa
 - Totalna parenteralna nutricija
10. Sta se prvo primenjuje u lecenju akutnih krvarecih variksa jednjaka
 - **Sengstaken-Blekmorova sonda**
 - Skleroterapija
 - Band ligature
 - Endoskopska omca
 - Inhibitori protonske pumpe
11. Koja se th upotrebljava u lecenju ulkusne bolesti izazvane infekcijom s HP
 - Inhibitor protonske pumpe
 - Inhibitor protonske pumpe u kombinaciji s jednim antibiotikom
 - **Inhibitor protonske pumpe u kombinaciji s 2 antibiotika**
 - Inhibitor protonske pumpe u kombinaciji s bizmutom
 - Dva antibiotika
12. Kada pacijent s ulceroznim kolitisom u lab parametrima ima I holestazu najcesce treba posumnjati na
 - Cirozu jetre
 - Primarnu bilijarnu cirozu
 - **Primarni sklerozirajuci holangitis**
 - Tumor glave pankreasa
 - Ni na jedno od navedenih
13. Najpouzdaniji EKG znak uspesne reperfuzije kod bolesnika sa infarktom miokarda sa ST elevacijom je u prvih 90 min
 - Pojava spore VT
 - Berzhold-Jarischov refleks (bradikardija-hipotenzija)
 - Pojava bigeminije
 - **Spustanje elevacije ST za vise od 70%**
14. Pri razvoju ishemije tokom testa fizickim opterećenjem poslednja je
 - Pojava EKG promena
 - Pojava eho promena
 - **pojava angine**
 - pojava porasta EDP leve komore
15. kupolasto ispupcenje prednjeg mitralnog listica u dijastoli je dvodimenzionalni eho znak
 - teske aortne insuficijencije
 - **mitralne stenoze**
 - prolapsa mitralne valvule
 - kalcifikacije posteriornog dela mitralnog
16. u bolesnika s perikardnim izlivom, na pretecu tamponadu srca ukazuje
 - velika kolicina izliva
 - **dijastolni kolaps desne komore I sistolni kolaps desne pretkomore**
 - dijastolni kolaps leve komore, bez obzira n avelicinu izliva
 - sistolni kolaps desne komore

17. koji su najvazniji preformisani medijatori anafilakse
- prostaglandini I leukotrijeni
 - **histamin I eozinofilni hemotakticni faktor**
 - eozinofilni katjonski protein
 - anafilatoksini C3a I C5a
18. koji se lek prvi primenjuje u th anafilaktickog soka
- antagonista H1 receptora
 - kalcijum
 - **adrenalin**
 - glikokortikosteroid
19. aspirinska astma udruzena je sa
- vazomotornim rinitisom
 - **nazalnom polipozom**
 - devijacijom nosnog septuma
 - hronicnim otitisom
20. najcesca metabolicka artropatija je
- osteoporoza
 - osteomalacija
 - **giht**
 - hondrokalcinoza
21. u imunsko-imflamacijskom zapaljenju u reumatoidnom artritisu ucestvuju
- samo celijski imunitet
 - samo humoralni imunitet
 - **oba**
 - nijedan
22. kojom se metodom slikanja mogu najpreciznije otkriti eventualni uzroci lumbalnog sindroma
- rtg LS kicme
 - CT LS kicme
 - **MR LS kicme**
 - Nijednom
23. Bronhoopstrukciju potvrđuje
- VC<70%
 - FEV1<70
 - **FEV1/FVC < 70**
 - PEF< 70%
24. Primarna TBC se karakterise pojavom
- Uvecanjem regionalnih Igl
 - Uvecanjem regionalnih Igl I pojavom primarnog afekta
 - Pojavom Gonovog kompleksa
 - **Sve navedeno**
25. Prisustvo respiratornih simptoma zbog Ca pluca najvise zavisi od
- Zivotnog doba bolesnika
 - Pridruzenih bolesti
 - Histopatoloskog tipa Ca
 - **Lokalizacije tu**
26. Najpouzdaniji nacin procene stepena hipoksemije je
- **Merenje parcijalnog pritiska kiseonika u arterijskoj krvi**
 - Parc pritisak kiseonika u arterijalizovanoj (kapilarnoj) krvi
 - Saturacije hemoglobina kiseonikom
27. Koji od sledecih odgovora je tacan za dg feohromocitoma
- Prvi inicijalni skrining test je merenje kateholamina u plazmi
 - 24h urin za merenje kateholamina ili metabolita kateholamina je ekvivalentno za tacnu dg
 - Posle skupljanja urina urin treba razblaziti za NaCl I rashladiti
 - Idealno vreme za skupljanje urina je tokom perioda klinicke stabilnosti jer snazna aktivnost moze lazno povecati nivo slobodnih urinarnih kateholamina
28. Koja analiza ima najveću senzitivnost za otkrivanje dijabetesne nefropatije
- Nivo kreatinina u serumu
 - Kreatinin klirens
 - **Albuminurija**
 - OGTT
 - EHO bubrega
29. Sindrom MEN I ne cine tumori ili hiperplazija jedne od sledecih zlezda
- **Nadbubrežne zlezde**
 - Pankreasne celije ostrvaca
 - Pituitarne zlezde
 - Paratireoidne zlezde
30. Koji su osnovni kriterijumi za postavljanje dg tireotoksicne krize
- Povećana temperatura
 - Visok nivo tireoidnih hormona
 - Delirantno stanje
 - Dehidracija
 - **Svi pomenuti simptomi**

Oktobarski test

1. Kozna manifestacija alergije na lek koja se uvek javlja na istom mestu je
 - Fiksni eritem
 - Multikokalni eritem
 - Urtikarija
 - Vaskulitis
2. Kod SEL izazvanog lekovima prisutna su koja At.....antihistonska
3. Eozinofili povišeni svuda osim
 - Sarkoidoza
 - Th glikokortikoidima
 - Bronhijalna astma
4. Primarna bilijarna ciroza ima sve osim
 - Antimitohondrijalna At
 - Krioglobulini
 - Cesce se javlja kod žena
 - Udružena sa CREST sindromom
 - Zadovoljavajuća th je th D penicilaminom
5. Rani test opterećenjem posle infarkta miokarda služi za
 - Procenu stepena rizika od kasnih komplikacija
 - Procenu fizičke kondicije
 - Procenu viabilnosti miokarda
6. Kasna in stent stenoza nakon obustave antiagregacione th javlja se
 - 2 dana nakon prekida antiagregacione th
 - 5 dana nakon...
 - 10 dana nakon...
 - Mesec dana nakon...
7. PCI u AIM treba izvesti 90 min od
 - Pojave bola u grudima do dolaska u bolnicu
 - Od pojave bola do početka intervencije +
 - Od pojave bola do poziva SHP
 - Od dolaska SHP do dolaska u bolnicu
8. Bolesnik ima ascit, u lab analizama hipohromna anemija sumnjati na....i policitemiju veru
 - Erozivni gastritis
 - Ulkusnu bolest
 - Bad kvari +
9. Povišena alkalna fosfataza, Ca I P norm, fizikalni nalaz b.o.
 - Osteomalacija
 - Primarni hiperparatireoidizam
 - Pedzetova bolest
 - Solitarni plazmocitom
10. Flu like sindrom se javlja kod primene
 - Izonijazida
 - Rifampicina +
 - Etambutola
 - Pirazinamida
11. Kad se multipli mijelom leci hemioth
12. Kriterijum za urinarnu inf
 - Cilindri
 - Više od 10eritrocita
 - Više od 10 leukocita
13. U akutnoj bubrežnoj insuficijenciji bubrezi se
 - Veci nego kod HBI osim okd amiloidoze I policistizma
14. Aminoglikozidi kod HBI
 - Ne davati
 - Davati oprezno uz hidraciju I redukovane doze
 - Ne davati kod starijih
15. Koja je kozna manifestacija anafilakse...urtikarija I angioedem
16. Najcesca prekanzeroza...kod Ca jednjaka
 - Ahalazija
 - Baretova sluznica
 - HP infekcija
17. Alkoholcar, ne jede 10 dana, hipoglikemija 2 mmol/l, poremećaj svesti, drhtanje.od strane SHP dobio 25 ml 50% glukoze u prijemnoj ambulanti uraditi
 - Dati jos 25 ml 50 % gly
 - Dati folate
 - Pregled neurologa
 - CT endokranijuma
 - Dati tiamin
18. Žena migrene oko menstruacije, tad hladni otečeni prsti, otok prolazi na aspirin, Le 13, Tr 600, Hgb 103, MCV 82. Sumnjati na
 - Distonia neurovegetativa
 - Vaskulitis
 - Trombocitopeniju
 - Esencijalnu trombozu +
19. Th TBC pluća traje
 - 3 meseca
 - 6 meseci +
 - 9 meseci
 - 12 meseci
20. Procena stepena opstrukcije na osnovu
 - FEV1 +
 - VC
 - FEV1/VC
 - FEV1/FVC
21. Bronhoprovoćajskim testom se dokazuje
 - Hiperreaktivnost disajnih puteva +
 - HOBP
 - Bronhijalna astma
22. Bronhodilataćajski test negativan ukazuje na
 - Ireverzibilnu opstrukciju
 - Ne treba davati bronhodilatatorni lek
 - Lek nije doveo do bronhodilataćajije +
 - Reverzibilna opstrukcija
23. Spirometrijom se ne može dg
 - Opstrukcija
 - Restrićajija
 - Popustanje levog srca

24. Malapsorpcija usled bakterijske kolonizacije tankog creva se dokazuje na osnovu svega osim
- Steatoreje ksiluloza izdisajnim tesom
 - Holil glicin izdisajnim testom
 - Shilingovim testom (b12 +intrinsic factor) +
25. Lazno snizene vrednosti amilaze kod akutnog pankreatitisa se mogu videti kad
- Hipertrigliceridemija

1. Fab klasifikacija akutne mijeloidne leukemije.....ima 8 vrsta
2. Th sideropenijske anemije...Fe
3. Sta ne dolazi u dif dg anginoznog bola.....bronhiektazije
4. Dg akutnog pankreatitisa.....amilaza
5. Teska hiperK se leci....diuretici henleove petlje + glukoza + insulin
6. Dg cistitisa.....leukociturija I urinokultura
7. Inf gornjih urinarnih puteva.....akutni pijelonefritis I apsces bubrega
8. HLA B27 je marker za.....spondiloartropatije
9. U RA proces pocinje na.....sinovijskoj opni
10. Dg ulkusne bolesti
11. Ritam galopa.....srcana insuf
12. Zvonom se slusa.....MS I ritam galopa
13. Eutireoidna srtuma..... ↑ tireoidea bez poremećaja funkcije
14. Bolna uvecana tireoidea u supfebrilnosti....znaci subakutnog tireoiditisa
15. Sta je eritema nodozum
16. Kazeozna pneumonija...oblik akutne bronhogene TBC
17. Siguran znak cor pulmonalae chr....
18. Dg aritmija....EKG, PQ I QRS
19. Digitalis...za brze pretkomorske aritmije sa brzim sprovođenjem u komoru
20. Aortna insuficijencija...rani dijastolni sum I divergentni puls
21. Giht...akutni monoarthritis
22. Dokaz opstrukcije u disajnim putevima↓ FeV1
23. Disajni sum oslabljen....izliv, pneumotoraks
24. Asimptomatska metastaza Ca pluca....cns, jetra..???
25. ...hipertrihoza
26. Anafilaksa....u roku od 30 min
27. Insipidni dijabetes...poliurija, nokturija, kompenzatorna polidipsija
28. Th mb crohn
29. Krvarenje u AML.....↓ Tr
30. Th DM tip II u gojaznih...dijeta + derivati sulfonil-ureje

1. Reumatoidni artritis u pocetku se manifestuje...promenama u malim zglobovima sake I stopala
 2. Koja je komplikacija pneumonije.....
 3. Pri akutnom pogorsanju astme daje se prvo....inhalacioni beta2 agonista
 4. EKG znak masivne plucne embolije....S1Q3T3
 5. Puls kod aortne stenozе je...parvus I tardus
 6. Cime se zaustavlja krvarenje izazvano antikoagulansima....infuzijom plazme
 7. Poboljšanje akutne bubrezne insuficijencije se ogleda.....poliurija
 8. Krvavao-sluzave stolice...ulcerozni kolitis
 9. Dg pneumonije se postavlja....Rtg
 10. Predilekciono mesto crohn-ove bolesti...ileocekalna valvula
 11. Kod nefrotkse proteinurije proteinurija je....>3.5 g/l/24h
 12. Anafilakticki sok kod penicilina...IgE
 13. Kod ciroze jetre histopatoloski patogmonicki....nodularna regeneracija
 14. Ileus na rtg....hidroaericne senke (moze I distenzija)
 15. Chr pankreatitis se dg,....steatoreja, kalcifikacije u pankreasu I dijabetes
 16. Dijabetična ketoacidoza se koriguje sa...kratko delujuci insulin
 17. Giht nastaje zbog poremećaja metabolizma...purina
 18. Dg poremećaja ritma...EKG, PQ talas, QRS I njihovi odnosi
 19. Klinicka slika bronhiektazija...obilna expektoracija na puna usta pre svega ujutru
 20. Adisonova bolest....hiponatrijemija I hiperkalijemija
 21. Paroxizmalna nocan dispneja...srcana insuff (moze I astma)
 22. Lupus kl slika....sve navedeno
 23. Limomi su...tumori limfocita I histiocita
 24. Th perniciozne anemije sa B12....dozivotna
 25. Subfebrilna temperatura bolna uvecana zlezda, sa smanjenom fiksacijom radioaktivnog joda....subakutni tireoiditis
 26. Auskultatorni nalaz mitralne stenozе....naglasen I ton, zvek otvaranja mitralne valvule (nakon S2), dijastolni sum, peristolni sum
 27. Primarni tuberkulozni afekt...subpleuralno u srednjim I bazalnim delovima pluca
 28. Serumska bolest...prototip reakcije imunih kompleksa
- Zvonom se slusa...mitralna stenoza
 - Dijafragmom...prvi I drugi srcani ton, aortna I mitralna regurgitacija, perikardno trenje