

LIMFNI SUDOVI I ČVOROV I ABDOMENA

NODI LYMPHOIDEI PARIETALES

1. NODI LYMPHOIDEI LUMBALES

Dele se na:

- a) *nodi lymphoidei lumbales sinistri* (oko aorta abdominalis) : - nodi lymphoidei preaortici
- nodi lymphoidei retroaortici
- nodi lymphoidei aortici laterales
- b) *nodi lymphoidei lumbales dextri* (oko v.cava inferior) : - nodi lymphoidei precavales
- nodi lymphoidei retrocavales
- nodi lymphoidei cavales laterales
- c) *nodi lymphoidei lumbales intermedii* (između aortae i v.cava inferior)

Limfa iz svih intraperitoneumskih i sekundarnih retroperitoneumskih organa uliva se u nodi lymphoidei preaortici et precavales, i nodi lymphoidei intermedii, a oni su grupisani oko neparnih visceralnih grana aortae abdominalis pa se dele na:

- nodi lymphoidei coeliaci (gaster, duodenum, lien, pancreas, hepar)
- nodi lymphoidei mesenterici superiores (jejunoileum, cecum, colon ascendens, colon transversum-desna polovina)
- nodi lymphoidei mesenterici inferiores (colon transversum-leva polovina, colon descendens)

Nodi lymphoidei aortici laterales, cavales laterales skupljaju limfu iz:

- retroperitoneumskih organa (ren, gl. suprarenalis, ureter-pars abdominalis)
- testisa i ovariuma
- zadnjeg zida abdomena
- donje polovine prednje-bočnog zida abdomena
- zidova i organa male karlice
- donjeg uda

Nodi lymphoidei retroaortici et retrocavales primaju limfu iz manjeg dela zadnjeg zida abdomena

2. SABIRNA LIMFNA STABLA

1. *Truncus lumbalis dexter* – nastaje spajanjem: - nodi lymphoidei cavales laterales
- nodi lymphoidei retrocavales
2. *Truncus lumbalis sinister* – nastaje spajanjem: - nodi lymphoidei aortici laterales
- nodi lymphoidei retroaortici
3. *Trunci intestinales*-nastaju spajanjem: - nodi lymphoidei preaortici
- nodi lymphoidei precavales
- nodi lymphoidei lumbales intermedii

Navedena sabirna stabla u nivo L1 i L2 formiraju cisterna chyli od koje polazi ductus thoracicus.