

РАНЕ (прекид континуитета коже)

Рана дакле представља улазна врата инфекције!

Може бити:

- Огуљотина
- Раздеротина
- Расекотина
- Убодна рана

ЦИЉЕВИ: заштита од накнадног загађења, инфекције или озлеђивања заустављање крварења, односно упијање крви или секрета из ране механичка потпора повређеном ткиву и ублажавање бола

МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ:

1. зауставити крварење
2. не дирати прстима
3. ничим не посипати
4. не испирати
5. не водити страна тела
6. стерилно прекрити рану
7. по потреби и ако има времена рану превити и обезбедити (код превијања првим завојима нема правила, калико завоји се постављају преко првих по шемама за дату повреду и део тела)

Посебне процедуре

- Пнеумоторакс

Најчешће пункциона, убодна, устрелна или прострелна рана. Шиштећа рана, мехурићи у крви, отежано дисање.

П.П.

Поставити стерилну газу на рану, преко тога непропусни материјал који ће покрити рану (идеално и читаву газу) и све чврсто превити или залепити за кожу, извршити херметизацију. П/о поставити у полуседећи положај, нагнуто на страну повреде. Хитан позив!

- Отворена повреда трбуха

Најчешће су у питању тангенционе повреде трбушног зида са испадањем трбушног садржаја.

П.П.

Не покушавати враћање испалог садржаја! Рану и испали садржај трбушне дупље прекрити стерилно и превити завојем за трбух, прилазним уз попуштање тура да би избегли укљештење црева. П/о поставити у лежећи положај са савијеним ногама у коленима. Не давати ништа за пиће! Хитан позив!

- Опекотине

Отворен пламен, усијани предмети, течности, паре. Четири степена.

Први- само црвенило. Други – пликови. Трећи – отворена повреда! Четврти- угљенисано ткиво.

Процена површине правилом деветке. Велике површине – масивно ослобађање протеина, едем, губитак течности, шок.

П.П.

Опекотине до другог степена, очуван интегритет коже, хладити под млазом хладне воде десетак минута или на други начин. Повреде стерилно прекрити и наставити хлађење преко превијене ране. За опекотине трећег и четвртог степена важи правило да се не поливају, испирају, посипају нити мажу јер су отворене! Рану прекрити стерилно и по превијању прекрити непропусним материјалом, фолијом ради спречавања губитка течности. Код ових опекотина се практикује превијање преко одеће. Пожељна имобилизација. Хитан позив! Код опекотина врелим парама, гасовима – спржене ноздрве – едем плућа! Шок!