ТРАУМАТСКЕ АМПУТАЦИЈЕ

Реплантација је могућа у року од 6 до 12 часова од настанка повреде

МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ:

- Мере неодложне прве помоћи

- Мере збрињавања патрљка
  1. крварење зауставити компресивним завојем
  2. Есмарх се поставља лабаво, са могућношћу промптног затезања
  3. ДИРЕКТНО НА РАНУ ИДЕ СТЕРИЛНА КОМПРЕСА и прекрива се стерилном газом
  4. учвршћује се завојем а около иде пластична врећа и око ње лед
  5. ИМОБИЛИСАТИ!!!
  6. сталан надзор, због могућег крварења након попуштања грча крвних судова

- Мере збрињавања откинутог или одсеченог дела тела
  1. ампутат се НЕ ЧИСТИ, НЕ ИСПИРА, НЕ ДЕЗИНФИКУЈЕ
  2. прекрива се стерилном газом (неколико слојева)
  3. херметизација пластичном кесом
  4. облагање ледом у већој пластичној врећи
  5. заптивање вреће и паковање у погодну тканину (пешкир)
  6. прибелешка о идентитету повређеног лисца и времену настанка повреде
  7. хитан транспорт!! Ампутат се транспортује уз повређеног