

УЈЕДИ

УЈЕД ЗМИЈЕ

Сваки ујед змије се третира као ујед отровнице!!!
Отров изазива токсични шок праћен згрушавањем крви.

ЗНАЦИ:

Паника, јак бол, отежано дисање, бледило, повраћање, пролив, у тежим случајевима губитак свести продубљен до коме.

Локално 2h после уједа: модрило и оток, уз често отицање локалних лимфних чворова.

МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ:

- Смиривање и строго мировање повређеног
- Слане хладне облоге на ујед
- Имобилизација и постављање у одговарајући положај (повређени део тела ниже од нивоа срца)
- Мере неодложне помоћи и сталан надзор
- Хитан транспорт уз пратиоца

УЈЕДИ ЖИВОТИЊА

УЗРОЦИ:

Најчешће су у питању домаће животиње (случајно или ако су оболеле), дивље животиње у зоолошком врту или у природи

РИЗИЦИ:

Због изгледа и дубине ране као и садржаја бактерија у устима животиња постоји ризик од тешких инфекција, тетануса, беснила, крварења...

МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ:

- Мере безбедности за спасиоца и повређеног
- Обилно испирање ране топлом водом и прање сапуном
- Стерилно покривање ране
- Заустављање крварења ако је обилно
- Имобилизација код опсежних рана
- Обавезан одлазак повређеног у здравствену установу без обзира на величину ране ради провере антитетанусне заштите и процене потребе вакцинације против беснила

УБОДИ ИНСЕКТА

УЗРОЦИ:

Осе, стршњени, обади

РИЗИЦИ:

Због избацивања садржаја жаоке може се развити оток, бол, црвенило на месту убода, али код осетљивих људи може доћи и до бурне алергијске реакције поготову ако је убод у пределу уста и грла. Такође постоји ризик од преношења вирусног менинго-енцефалитиса.

МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ:

- Ако је жаока још у кожи треба је пажљиво извући пинцетом
- Ставити хладан облог
- Ако је угриз у пределу уста дати повређеном да сиса лед

УЈЕД КРПЕЉА

ЗНАЦИ:

Најчешће без симптома, поготово ако је на делу тела који не видимо. Може се јавити бол и непријатност на месту уједа. Крпељ се најбоље види када се напије крви и тада је погодан за вађење.

ПРВА ПОМОЋ:

Вађење крпеља уз помоћ пинцете. Неопхоно је дубоко поставити пинцету да не би глава заостала, када се обухвати пинцетом направити потез окретања у смеру казаљке на сату. Саветовати да се обрати лекару због могућности инфекције.